



PURALID
PURALID
PURALID
PURALID
PURALID
PURALID

Használati útmutató

Puralid® lipogel szemhéjszéli gyulladásban vagy szemhéjszéli- és kötőhártya-gyulladásban való használatra

Mi a Puralid® lipogel?

A **Puralid® lipogel** a szemhéjak és a szemkörnyéki területek nyugtatására és tisztítására szolgáló természetes készítmény.

Liposzómákat, teafaolajat, A-vitamint, xantángumit, ferulinsavat, E-vitamin TPGS-t, valamint alfa-bizabololt tartalmaz.

A **liposzómák**, amelyek kettős foszfolipid rétegből állnak, nyugtató és puhító tulajdonságaikról, valamint azon képességükről ismertek, hogy hatékonyan célba juttatják az aktív összetevőket.

A teafaolaj, amelyet az ausztrál teafából (Melaleuca alternifolia) nyernek, antimikrobiális tulajdonságairól ismert.

Az **A-vitamin** az epiteliális funkció szabályozásával erősíti és támogatja a bőrt. Emellett egy olyan antioxidáns, amely a xantángumival, a ferulinsavval és az E-vitamin TPGS-sel, valamint a liposzómákkal szinergikusan hatva védik a szemhéj felszínét a szabadgyökök és az UV-sugarak oxidatív hatásától.

Az **alfa-bizabolol** a kamilla illóolaj fő összetevője. Nyugtató tulajdonsággal rendelkezik, csökkenti a vörösséget és a gyulladást még különösen érzékeny bőr esetében is. Jó bőrtolerancia jellemzi.

Mire használatos a Puralid® lipogel?

A **Puralid® lipogel** felpuhítja és eltávolítja a szemhéjról a szemhéjszéli gyulladás vagy a kötőhártya-gyulladás során a szemhéjon keletkező hámló maradványok felpuhítására és eltávolítására szolgál.

Milyen gyakran használandó a Puralid® lipogel?

A terméket használja naponta kétszer vagy többször, ha orvosa úgy tanácsolja.


A Puralid® lipogel használatának módja

Az első használat előtt a flakont függőlegesen tartva 3–5-ször nyomja le a pumpát, ezzel feltöltve az adagolórendszert, amíg az el nem kezdi adagolni a gélt.


1. Alaposan mosson kezet.




2. Tegyen egy kis adag **Puralid® lipogel** az ujjhegyére.



3. Gyengéd, körkörös mozdulatokkal oszlassa el a szemhéjain.



4. Hagyja hatni pár percig. A hámló maradványokat törölje le tiszta törülközővel vagy vattakoronggal.



A termék használata előtt olvassa el figyelmesen a teljes használati útmutatót. Tartsa meg ezt a tájékoztatót, előfordulhat, hogy később még szüksége lesz rá.

Bármilyen további kérdés esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez.

Melyek a lehetséges mellékhatások?

AMENNYIBEN BÁRMELY MELLÉKHATÁSTTAPASZTAL, TÁJÉKOZTASSA ORVOSÁT VAGY GYÓGYSZERÉSZÉT.

A Puralid® lipogel tárolása

- Tárolás 25 °C alatt.
- Ne fagyassza.
- Hőtől, nedvességtől, közvetlen napfénytől védve tartandó.
- Gyermekektől elzárva tartandó.

Összetétel:

Foszfolipidek S80 (a NIOliptól), bizabolol, teafaolaj, A-vitamin-palmitát, E-vitamin TPGS, ferulinsav, xantángumi, EDTA dinátrium dihidrát, kálium- szorbát, nátrium-benzoát, nátrium-hidroxi-metil-glicinát, citromsav-monohidrát, kálium-citrát három bázisúmonohidrát, desztillált víz.

Figyelmeztetések

- Kizárólag külső használatra.
- A termék bármely összetevőjével szembeni túlérzékenysége esetén ne használja a terméket.
- Ne használja a terméket a csomagoláson feltüntetett lejárati időn túl.
- Ne használja a terméket, ha a csomagolás sérült.
- A terméket az első alkalmazás utáni 8 héten belül használja fel (15 ml-es flakon).
- A terméket az első alkalmazás utáni 24 órán belül használja fel (1 ml-es minitartály).

Kiszerezés:

Kereskedelmi: 15 ml-es flakon

Minta: 5 db 1 ml-es minitartályból álló csík

További információért forduljon orvosához vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi Santen kirendeltséggel a www.santen.eu weboldalon.



OFFHEALTH SpA, Via G. Paisiello
10,50144 Firenze, Olaszország

Ez az útmutató 2020 decemberében került jóváhagyásra

Ez az útmutató 2020 decemberében került jóváhagyásra.

							25°C	
Gyártó	Gyártási dátum	Gyártási létesítmény	Lejárati idő	Tájékoztató használati útmutatóból.	Ne használja, ha a csomagolás sérült.	Nedvességtől óvando.	Tárolás 25 °C alatt.	Napfénytől óvando.

